

Berlin, 25.04.2022

## Numerik I

### Übungsserie 02

**Achtung:** Es werden nur Lösungen bewertet, deren Lösungsweg klar erkennbar ist. Alle Aussagen sind zu begründen. Aus der Vorlesung bekannte Sachverhalte können vorausgesetzt werden. Bloße Angabe der Ergebnisse gibt keine Punkte !

1. *Unterschiedliche Bestapproximationen eines Polynoms.* Seien  $V = C([-1, 1])$ ,  $f(x) = x^4$  und  $U = P_3$  der Raum der Polynome dritten Grades in  $[-1, 1]$ . Man berechne die Tschebyscheff-Approximation sowie die Bestapproximation in  $L^2(-1, 1)$  von  $f$  auf  $U$ . Von beiden Approximationen ermittle man den Fehler sowohl in der Maximumsnorm als auch in der  $L^2$ -Norm. **4 Punkte**

2. *Eigenschaften von Räumen und Basen.* Man löse folgende Aufgaben.

- i) Seien  $V$  ein Prä-Hilbert-Raum,  $U$  ein endlich-dimensionaler Unterraum von  $V$  und  $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$  eine Basis von  $U$ . Des Weiteren seien  $f \in V$  und  $u \in U$ . Man zeige, dass

$$(f - u, v) = 0 \quad \forall v \in U$$

genau dann erfüllt ist, wenn es für alle Basisfunktionen von  $U$  erfüllt ist.

- ii) Sei  $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$  eine Basis von  $U$ . Man zeige, dass die in der Vorlesung definierte Gramsche Matrix

$$A = (a_{ij})_{i,j=1}^n, \quad a_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j),$$

symmetrisch und positiv definit ist.

- iii) Man gebe ein Beispiel dafür an, dass  $V = C([a, b])$  mit  $\|\cdot\|_V = \|\cdot\|_\infty$  kein streng normierter Raum ist.

**4 Punkte**

3. **Abgabe bis 09.05.2022**

*Approximation von Funktionen durch Polygonzüge, Programmieraufgabe.* Betrachte die Funktion  $f(x) = \sin(x)$  im Intervall  $[0, 2\pi]$  und betrachte die Bestapproximation in  $\|\cdot\|_{L^2}$ . Man unterteile das Intervall äquidistant in  $n$  Teilintervalle der Schrittweite  $h = 2\pi/n$  und verwende zur Approximation den Raum

$$S_n = \{u_n \in C([0, 2\pi]) : u_n|_{[kh, (k+1)h]} \in P_1([kh, (k+1)h]), k = 0, \dots, n-1\}.$$

- i) Man bestimme den Fehler

$$\max_{k=0, \dots, n} |f(kh) - u_n(kh)| \approx \|f - u_n\|_\infty$$

für  $n = 2^l$ ,  $n = 0, 1, \dots, 128$ .

- ii) Welche Abhängigkeit des Fehlers von der Schrittweite kann man beobachten?

**6 Punkte**

Die Übungsaufgaben sollen in Gruppen von drei oder vier Studierenden gelöst werden. Sie sind bis **Montag, 02.05.2022, 12:00** abzugeben, entweder in das Fach des Tutors oder elektronisch.